




COMMENT ÉVOLUE LA FLORE DICOTS DEPUIS LE 1^{ER} BULLETIN ?

70% des parcelles avec présence de dicots ou vivaces

Parcelles avec présence de dicots ou vivaces




Plus de la moitié sont des parcelles désherbées à l'automne



QUELLE FLORE DICOTS PRÉSENTE DANS LES PARCELLES DU RÉSEAU ?

24 dicots (ou vivaces) différentes (vs 18 au bulletin précédent)



Le gaillet reste est en tête, suivi d'un trio rumex sp., véronique fdl et séneçon

% de parcelles avec présence

✓ Désherbée à l'automne

✗ Non désherbée à l'automne



À RETENIR

Jérémy Loche – RTM PdL/PC - 06 98 58 04 74



La **présence de dicots** s'est accentuée depuis le premier bulletin avec **70% des parcelles** du réseau concernées. Le **gaillet est en tête**, avec de **nouvelles levées** et de nouvelles parcelles concernées sur quasiment l'ensemble des départements. **A surveiller, le chardon** des champs, qui progresse. Les **conditions météo** de la semaine semblent **favorables au développement des adventices** (attention aux gelées et aux amplitudes thermiques pour de bonnes conditions d'applications des désherbages).




BÉNÉFICES DE LA FORMULATION SX®

BÉNÉFICES DE LA FORMULATION SX®

- > Mesure facile et formulation stable
- > Solubilisation dans l'eau accrue
- > Plus rapide, plus d'activité
- > Rinçage pulvérisateur simplifié
- > Utilisable à partir de 50 l/ha de bouillie

SX® complètement soluble dans l'eau :



BOTA'CLUB : NUISIBILITE DES ADVENTICES

Nuisibilité directe de quelques adventices : **Nombre de pieds suffisants au m² pour faire chuter le rendement de 5 % des céréales à paille** (Source : ARVALIS - Institut du végétal, Wilson, HGCA, ACTA, ...)

Gaillet	1.8	Véronique de Perse	26.0
Folle avoine	5.3	Véronique F de L	44.0
Coquelicot	22.0	Lamier	44.0
Matricaire	22.0	Myosotis	66.0
Ray-Grass	25.0	Pensée	133.0
Vulpin	26.0	Alchémille	133.0
Stellaire	26.0		

Le coup de pouce



FlashFlore
Outil de reconnaissance des adventices

